


# PRÉVENTION DES BRONCHIOLITES À VRS\*

## QU'EST-CE QUE LA BRONCHIOLITE ?

La bronchiolite est une infection respiratoire causée principalement par le VRS (Virus Respiratoire Syncytial) qui touche les petites bronches. Le virus entraîne une gêne respiratoire parfois sévère, pouvant aboutir à une hospitalisation. Cette maladie est très contagieuse et transmissible par la salive, la toux et les éternuements.

## IMPACT DE LA BRONCHIOLITE

La bronchiolite touche 90 % des nourrissons de moins de 2 ans et présente un risque accru de formes sévères chez les enfants de moins de 6 mois. Elle peut également toucher les enfants bien portants : 87 % des hospitalisés sont sans facteurs à risques et 89 % sont nés à terme.



## COMMENT L'ÉVITER ? DEUX POSSIBILITÉS EXISTENT !



### PENDANT LA GROSSESSE

Le vaccin **Abrysvo®** est proposé aux femmes enceintes entre la fin du 7<sup>e</sup> mois et la fin du 8<sup>e</sup> mois de grossesse. Il permet de transmettre des anticorps au bébé via le placenta, offrant ainsi une protection contre le virus respiratoire syncytial (VRS) dès la naissance et jusqu'à l'âge de 6 mois.

#### Effets secondaires rapportés :

- Très fréquents (plus de 10 %) : douleur au site d'injection.
- Fréquents (1 à 10 %) : rougeur, gonflement au site d'injection, maux de tête, douleurs musculaires.

La prescription et l'administration du vaccin peuvent être effectuées par un médecin, un pharmacien, un infirmier et une sage-femme. Il est disponible en officine de ville et dans les établissements de santé. **Il est remboursé par l'Assurance maternité à hauteur de 100 %.**



### DÈS LA NAISSANCE JUSQU'À L'ÂGE DE 6 MOIS

Le **Beyfortus** est un traitement préventif disponible depuis l'automne 2023.

Il est administré en une injection unique au nourrisson par voie intramusculaire dans la cuisse. Cette injection d'anticorps anti-VRS protège les nouveau-nés en quelques jours après l'injection et pendant 6 mois. Il est indiqué pour l'ensemble des nourrissons, ceux nés à terme mais aussi prématurément.

#### Effets secondaires rapportés :

- Effets indésirables peu fréquents (< 1 %) et bénins
- Sensibilité, gonflement au point d'injection, Fièvre, Éruptions cutanées

Les nouveau-nés peuvent en bénéficier avant ou après leur sortie de la maternité. Il peut être prescrit par le médecin ou la sage-femme et administré par le médecin, la sage-femme ou un infirmier. Il est disponible en officine et dans les maternités. **En ville, Beyfortus est remboursé par l'Assurance maladie à hauteur de 30 %. Au sein des maternités, il est remboursé à 100 %.**

\* VRS: virus respiratoire syncytial / \*\* Source : HAS

# PRÉVENTION DES BRONCHIOLITES À VRS\*

## LES GESTES BARRIÈRES POUR ÉVITER DE TRANSMETTRE LA BRONCHIOLITE



Se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, avant et après chaque change, tétée, repas ou câlin



Aérer régulièrement l'ensemble du logement



Laver régulièrement ses jouets et ses peluches



Porter un masque en cas de rhume toux ou fièvre



Éviter d'emmener son enfant dans les endroits publics confinés (transports, commerces...).



Ne pas partager ses biberons, sucettes ou couverts non lavés



Ne pas fumer à côté des bébés et des enfants.

### EN CAS DE SYMPTÔMES :

En cas de symptômes, j'appelle d'abord mon médecin.  
S'il n'est pas disponible, je fais le 15 avant d'aller aux urgences



\* VRS: virus respiratoire syncytial / \*\* Source : HAS